


Prévention des diarrhées des veaux

Quels sont les principaux microbes responsables de diarrhées ?




Les bactéries, virus et parasites peuvent affecter les jeunes veaux. Lorsqu'il y a des pertes, les principaux agents trouvés en fonction de l'âge se répartissent selon le graphique ci-contre.

Comment prévenir les pertes ?

La prévention des diarrhées passe par des mesures d'hygiène de l'élevage, et une transmission correcte de l'immunité maternelle :

- ☐ VEILLER A LA PRISE DU COLOSTRUM car durant le premier mois de sa vie, c'est son seul moyen de défense contre les microbes : 1,5 à 2 litres dans les 3 premières heures de vie, et là 4 litres minimum au cours des premières 24 heures,

Vérification de la qualité du colostrum



- ☐ Lorsque des problèmes plus importants sont rencontrés, il peut être nécessaire de VACCINER LES MERES deux à trois semaines avant la mise-bas. Votre vétérinaire vous recommandera le vaccin adapté aux microbes rencontrés dans l'élevage. En cas d'épidémie de diarrhées, il est également possible d'apporter aux veaux des anticorps par des injections de sérum.
- ☐ ISOLER LES VEAUX dans un endroit propre, fréquemment paillé, et si possible en CASES INDIVIDUELLES : lorsqu'un veau a la diarrhée, cela fait déjà plusieurs heures que les virus se multiplient dans son organisme. L'isolement en case individuelle permet d'empêcher les contaminations entre animaux.



- Clôtures électriques
- Matériel de traite
- Produits nutritionnels
- Matériel vétérinaire
- Equipement d'élevage

Pour plus de renseignements, nos coordonnées :

e-mail
info@agrodirect.fr

Téléphone
04.76.05.97.81

Fax
04.76.05.28.63